

<u>Vista</u>	<u>Tiempo</u>	<u>Detalles</u>
<b>1 Blefaroespasma</b>		
Frontal, zoom a la cara	3 min.	Paciente con los ojos abiertos, mirando a la cámara. Buena iluminación. Contar número de espasmos y duración de los mismos.
<b>2 Distonía oromandibular</b>		
Frontal, zoom a la cara	30 seg.	Reposo
Protrusión lingual	30 seg.	El paciente saca la lengua y la mantiene quieta.
Bebida (1)	15 seg.	Bebe líquidos de un vaso
Bebida (2)	15 seg.	Bebe líquidos con una pajita.
Masticación y deglución	20 seg.	Mastica y come unas galletas.
<b>3 Distonía laringea</b>		
Frontal utilizar micrófono	2 min.	Lectura del texto adjunto
<b>4 Espasmo del escribiente y otras distonias en brazo</b>		
Frontal	60 seg.	Incluir en el campo las manos, los brazos y antebrazos. El paciente escribirá con ambas manos la ciudad, la fecha (con letras), su nombre y sus dos apellidos y su dirección postal y un teléfono. Dibujara también con ambas manos un círculo, un cuadrado de unos 5 cm. de lado, un cubo de igual lado, una margarita de 8 pétalos y una espiral de al menos 3 vueltas
<b>5 Distonias axiales</b>		
a) Reposo	30 seg.	Vista frontal de frente y de espalda. Paciente desnudo, al menos de cintura para arriba.
b) Deambulación	30 seg.	Caminar 3-4 metros desde y hacia la cámara y girar dos o tres veces de prisa.
<b>6 Distonia en piernas</b>		
a) Deambulación	2 min.	Paciente caminando hacia y desde la cámara. Desplazamiento rápido. Conviene que la videofilmación vaya precedida de ejercicio.
b) Movimientos alternantes	1 min.	El paciente golpea alternativamente el suelo con la punta del pie y posteriormente con el talón. Primero del pie derecho y luego del pie izquierdo.